

“ ”

“ ”

“ ”， 为何？
 5 ， 个乡 反 园出 大 “ ”
 ， ，
 可为 、叶 ，以为 和 为主。



“ ”

一、危 :

1、叶 : 叶后 2~3 即可发 ，叶 、叶 叶 两侧出 不 ，
 叶 到叶 基 ， 叶 下垂，严 个叶丛 ， ，后
 可产 ；

2、 : 多从 ， 坏 ， 及 呈 ，受
 下垂



二、发 生：

原 为 害 虫 ， 在上一 年（僵） 枝、 叶和 根 上 冬 眠；
 发 生 条 件 （ 温 度 20 ℃ 以 右、土 壤 湿 度 30%以 上），产 量 大 ， 传 播 快 ，
 侵 害 为 害 枝、叶 枯 死 ，在 枝 和 根 上 为 6-7 天 ， 根 上 为 9-10 天 ；

发 生 条 件 叶 低 多 ， 发 叶 少 ； 根 低 多 ， 根 少 ， 则 受 害 严 重 ； 不 同 以 及 发 生 势 强 ， 体 弱 ； 外 部 条 件 地 园、土 壤 湿 度 不 同 以 及 地 园 也 发 生 。

在 了 区 域 、 乡 镇 在 4 月 10 日 以 后 ， 一 般 在 5 月 5-10 日 ， 且 在 内 部 中 在 18℃-23℃， 加之 多 数 为 传 播 及 侵 害 供 了 利 件， 发 生 。

三、 防 治：

- 1、加 强 培 养：增 强 中 元 充 实，增 强 势 力；合 理 修 剪，使 冠 内 光 照 充 足，后 及 时 修 剪。
- 2、及 时 出 园：出 园 后，上 部 枝 干 僵 死、叶 和 根 枯 死，出 园 外 中 心 埋 土，从 减 弱 冬 害；发 生 初 期，及 时 剪 除 枯 枝、叶。
- 3、剂 量：可 在 发 生 前 使 用 国 光 200-300 倍 + 基 肥（50% 基 肥）600-800 倍 出 园，使 用 国 光 利（50% 利）1000-1500 倍（发 生 严 重 园）+ 利（80%代 理）800 倍，后 7 天 右 使 用 国 光 健 1500 倍 + 利 800 倍。

因 区域、品 种、 候 件、 件及 培 各 不同， 发
况也会 不同，以上 和 仅供参 考，各 园 况

。